

PROTEIINISYNTEESI

- Makrolidit ja ketolidit
  - Erytromysiini
    Roksitromysiini
    Klaritromysiini
    Atsitromysiini
  - Telitromysiini
- Linkosamidit
  - Klindamysiini
- Tetrasykliinit
  - Doksisykliini
    Tetrasykliini
    Minosykliini
    Tigesykliini
- Aminoglykosidit
  - Kanamysiini
    Tobramysiini
    Gentamysiini
    Amikasiini
    Netilmysiini
    Neomysiini
- Kloramfenikoli
- Fusidiinihappo
- Mupirosiini
- Oksatsolidinonit
  - Linetsolidi
- Streptogramiinit
  - Dalfopristiini
    Kinupristiini

FOOLIHAPPOSYNTEESI

- Sulfonamidit
- Trimetopriimi

SOLUKALVO

- Polymyksiinit
  - Polymyksiini E
    = Kolistiini
- Lipopeptidit
  - Daptomysiini

NUKLEIINIHAPPOSYNTEESI

- Fluorokinolonit
  - Siprofloksasiini
    Levofloksasiini
    Ofloksasiini
    Norfloksasiini
    Moksifloksasiini
- Aminokumariinit
  - Novobiosiini
- Rifamysiinit
  - Rifampisiini
- Nitroimidatsolit
  - Metronidatsoli
- Nitrofuraanit
  - Nitrofurantoiini

SOLUSEINÄSYNTEESI

- Glykopeptidit
  - Vankomysiini ks. VRE
    Teikoplaniini
- Basitrasiini
- Fosfomysiini

Beetalaktamaasien estäjät
(ei käytetä yksinään)

- Klavulaanihappo (+amoksisilliini)
  Tatsobaktaami (+piperasilliini)

Beetalaktaamit

- Penisilliinit
  - Bentsyylipenisilliini (G-pen)
    Fenoksimetyylipenisilliini (V-pen)
    Prokaiinipenisilliini
    Bentsatiinipenisilliini
  - Aminopenisilliinit
    - Ampisilliini
      Amoksisilliini
  - Stafylokokkipenisilliinit ks. MRSA
    - Metisilliini
      Kloksasilliini
      Dikloksasilliini
      Oksasilliini
  - Tikarsilliini
  - Piperasilliini
  - Mesillinaami
- Monobaktaamit
  - Atstreonaami
- Kefalosporiinit
  - I polvi — Kefaleksiini
  - II polvi — Kefuroksiimi, Kefoksitiini
  - III polvi ks. ESBL — Kefotaksiimi, Keftriaksoni, Keftatsidiimi, Kefpodoksiimi
  - IV polvi — Kefepiimi, Keftaroliini
- Karbapeneemit ks. CPE
  - Imipeneemi
    Meropeneemi
    Ertapeneemi

© Reetta Sihvonen, Johanna Haiko 2014